

**Branchement**

- a. 2 personnes sont indispensables (1 opérateur + 1 aide) pour effectuer le branchement.
- b. Il est recommandé de fermer portes et fenêtres. Limiter le passage.
- c. Il convient de mettre un masque et une charlotte à l'enfant ou de protéger son visage par un champ stérile .
- d. Le lavage des mains est recommandé chez l'enfant compte tenu des micro-organismes dont il est le porteur potentiel.
- e. La position décubitus dorsale est la position à privilégier pour la sécurité du patient (embolie gazeuse)
- f. Blouse et gants stériles sont indispensables pour l'opérateur avec masque, charlotte et lunettes pour assurer sa protection personnelle et celle du site.
- g. Un habillement non stérile avec port de masque, charlotte, lunettes et gants est recommandé pour l'aide .
- h. Un lavage antiseptique des mains (durée 1 minute) ou un traitement hygiénique par friction avec une solution hydro-alcoolique est justifié pour l'opérateur ainsi que pour l'aide.
- i. Une répartition des gestes dans leur chronologie entre l'opérateur et l'aide est justifiée par souci d'asepsie.
- j. L'utilisation d'un antiseptique seul, compatible avec le matériel du cathéter est recommandée pour la désinfection de l'embout du KT et celle des tubulures du générateur.
- k. Une protection stérile et sèche des extrémités distales du cathéter et des tubulures est justifiée pendant la séance.
- l. Il est hautement souhaitable que chaque enfant dispose de bandelettes adhésives stériles à usage unique ou d'un rouleau de sparadrap individualisé.
- m. Il est indispensable d'enlever les gants avant de toucher d'autres objets, de mettre des gants non stériles pour nettoyer les surfaces avec un produit détergent/désinfectant, puis d'effectuer un lavage simple des mains
- n. Il est indispensable de respecter l'organisation de la gestion des déchets

**Débranchement**

- a. 2 personnes sont indispensables (l'opérateur+ 1 aide) pour effectuer le débranchement.
- b. Il est nécessaire de fermer portes et fenêtres, limiter le passage
- c. Il convient de mettre un masque et une charlotte à l'enfant ou de protéger son visage par un champ stérile .
- d. La position décubitus dorsale est la position à privilégier pour la sécurité du patient (embolie gazeuse)
- e. Blouse et gants stériles sont indispensables pour l'opérateur avec masque, charlotte et lunettes pour assurer sa protection personnelle et celle du site.
- f. Un habillement non stérile avec port de masque, charlotte, lunettes et gants est recommandé pour l'aide.
- g. Une répartition des gestes dans leur chronologie entre l'opérateur et l'aide est justifiée par souci aepsie.
- h. Un lavage antiseptique des mains (durée 1 minute) ou un traitement hygiénique par friction avec une solution hydro-alcoolique est justifié pour l'opérateur ainsi que pour l'aide.
- i. L'utilisation d'un antiseptique seul, compatible avec le matériel du cathéter est recommandée pour la désinfection de l'embout du KT et celle des tubulures du générateur.
- j. Une protection stérile et sèche des extrémités distales du cathéter est justifiée après la séance.
- k. Il est hautement souhaitable que chaque enfant dispose de bandelettes adhésives stériles à usage unique ou d'un rouleau de sparadrap individualisé.
- l. Il est indispensable d'enlever les gants avant de toucher d'autres objets, de mettre des gants non stériles pour nettoyer les surfaces avec un produit détergent/désinfectant, puis d'effectuer un lavage simple des mains
- m. Il est indispensable de respecter l'organisation de la gestion des déchets

**Réfection de pansement**

- a. 2 personnes sont indispensables (1 opérateur + 1 aide) pour effectuer la réfection du pansement.
- b. Il est nécessaire de fermer portes et fenêtres, limiter le passage.
- c. Il convient de mettre un masque et une charlotte à l'enfant .
- d. Le lavage des mains est recommandé chez l'enfant compte tenu des microorganismes dont il est le porteur potentiel.
- e. Blouse et gants stériles sont indispensables pour l'opérateur avec masque, charlotte pour assurer sa protection personnelle et celle du site.
- f. Un habillement non stérile avec port de masque charlotte et gants est recommandé pour l'aide.
- g. Un lavage antiseptique des mains(durée 1 minute) ou un traitement hygiénique par friction avec une solution hydro-alcoolique est justifié pour l'opérateur ainsi que pour l'aide.
- h. Il est intéressant d'évaluer l'état cutané pour le suivi du patient (échelle d'appréciation visuelle ou score)
- i. Il paraît raisonnable d'adopter le rythme d'une à deux fois/semaine pour le changement du pansement.
- j. Il est recommandé d'effectuer une désinfection de l'orifice du cathéter en 4 étapes: déterision, rinçage (eau stérile), séchage et application d'un antiseptique.
- k. Une protection stérile et sèche de l'orifice est nécessaire.
- l. Il est hautement souhaitable que chaque enfant dispose de bandelettes adhésives stériles à usage unique ou d'un rouleau de sparadrap individualisé .
- m. il est indispensable d'enlever les gants avant de toucher d'autres objets, de mettre des gants non stériles pour nettoyer les surfaces avec un produit détergent/désinfectant, puis d'effectuer un lavage simple des mains
- n. Il est indispensable de respecter l'organisation de la gestion des déchets